

FORCE 7



African Swine Fever (ASF)

FREE ZONE

L'élevage

**Désinfectant à base de
glutaraldéhyde et
d'ammonium
quaternaires ayant un
large spectre d'activité
contre les bactéries, les
levures et les virus**




FORCE 7



Avantages

- Désinfectant à spectre large à base de glutaraldéhyde et de composés d'ammonium quaternaires
- Large spectre d'activité contre les bactéries, les levures et les virus
- Pour la désinfection des bâtiments d'élevage, des moyens de transport (y compris les pneus), des bottes et de l'équipement
- Efficacité testée contre la peste porcine africaine à 1 % et à 10 °C en 30 minutes à un faible niveau de salissure



Désinfection des surfaces / équipements

Nettoyer au préalable les surfaces et le matériel à désinfecter. Préparer une dilution de FORCE 7 :

- Bactéricide : 0,75% Levuricide : 0,5% Virucide : 1,5%

Appliquer par pulvérisation à basse pression ou par moussage sur les surfaces, les matériaux, les équipements, les véhicules de transport d'animaux ou les bottes.

- Temps de contact min. : 30 min. / Température : 10°C
- Appliquer la solution à raison de 200 ml/m² jusqu'à la limite de ruissellement.

Attendre 2 heures avant la rentrée des utilisateurs et des animaux dans les bâtiments d'élevage/véhicules de transport d'animaux après une application par pulvérisation/moussage.

EFFICACITÉ BACTÉRICIDE

EN14349 / 10°C / 30 min. / faible niveau de saleté

- **0,75%** : *Enterococcus hirae*, *Proteus vulgaris*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*

EN1656 / 10°C / 30 min. / faible niveau de saleté

- **0,5%** : *Enterococcus hirae*, *Proteus hauseri*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Staphylococcus aureus*
- **0,5%** : *Salmonella enteritidis*
- **0,25%** : *Salmonella typhimurium*
- **0,5%** : *Salmonella infantis*

EFFICACITÉ LEVURICIDE

EN16438 & EN1657 / 10°C / 30 min. / faible niveau de saleté

- **0,5%** : *Candida albicans*

EFFICACITÉ VIRUCIDE

EN14675 / faible niveau de saleté

- **0,5%** / 30 min. / 4°C & 10°C: *Virus de l'influenza aviaire (H5N2/H1N1)*
- **1%** / 30 min. / 10°C: Peste porcine africaine (ASF)
- **1,5%** / 30 min. / 10°C: *Bovine Enterovirus type 1 (ECBO)*

Substances actives:

pH à 10 g/L:

Stockage:

Durée de conservation:

Glutaraldéhyde, composés d'ammonium quaternaire (CAQ)

4,4±1 (valeur pH non diluée : 3,8)

Conserver dans un endroit propre, frais et bien ventilé, à l'abri des sources de chaleur et de lumière intense

Utiliser le produit dans les 24 mois suivant sa date de fabrication