

# La bonne gestion lors du sevrage

Le sevrage représente un stress énorme pour les porcelets. Outre la perte de la mère, les goretts se voient confrontés à un nouvel environnement, une nouvelle formation de groupe et un changement de l'alimentation. Les porcelets qui viennent d'être sevrés sont très sensibles aux maladies infectieuses. L'objectif d'une bonne gestion lors du sevrage est d'empêcher l'apparition de maladies et d'atteindre un bon accroissement par des conditions de détention idéales.



### L'essentiel en quelques lignes

1. Préparation en vue du sevrage
2. Mesures en matière de gestion
3. Alimentation des porcelets sevrés
4. Germes pathogènes importants lors du sevrage

## 1. Préparation en vue du sevrage

---

- Remplir les chambres de sevrage selon le système tout dedans – tout dehors
- Nettoyage et désinfection des chambres de sevrage et nettoyage des installations d'étable (nourrisseurs, abreuvoirs etc.).
- Avant la mise en place, les boxes doivent être secs et les nids ou le local pré-chauffés.
- La zone de repos doit être exempte de courants d'air et la température se situer à environ **27°C**.
- Les porcelets sous la mère devraient déjà avoir ingéré **0.6 - 1.0 kg** d'aliment par jour et par portée.
- Rincer à fond (pendant plusieurs minutes!) les conduites de l'abreuvoir afin d'empêcher l'absorption d'eau stagnante. Installer un nombre suffisant d'abreuvoirs (recommandation SSP:1 pour 8 animaux)!
- Contrôler le débit des abreuvoirs: **0.5 - 1.0 litre / minute**.
- Au début, si les gorettes n'ont pas encore l'habitude des pipettes, éventuellement mettre à disposition quelques abreuvoirs à bol (attention à l'hygiène).



Gorettes dans la caisse à porcelets

Si la température est correcte, les gorettes se couchent de manière détendue dans la caisse, le groin levé vers l'air frais. La température dans le box peut être réglée par un capteur thermique et un chauffage automatique.

## 2. Mesures en matière de gestion

---

- Minimiser le stress.
- Mélanger le moins possible les portées afin d'éviter un stress supplémentaire. Situation optimale: mise en place d'une portée par box.
- Lors de croissance irrégulière des porcelets, ils peuvent aussi être triés selon la grandeur.
- Des petits groupes jusqu'à 20 animaux permettent une bonne supervision. En plus, la détention en petits groupes favorise un accroissement homogène des animaux.
- Respecter l'ordre de suivi (d'abord les animaux les plus jeunes et sains)! Il y a des outils de nettoyage pour chaque chambre (grattoir, pelle, balais).
- Séparer impérativement les chétifs (box d'infirmerie).
- Ne pas mélanger les animaux d'un autre groupe en retard de croissance avec les porcelets qui viennent d'être sevrés.
- Lors du sevrage, au moins 28°C dans la zone de repos / la caisse à porcelets.
- Optimiser le climat d'étable! Des courants d'air ou un échange d'air trop faible provoquant des gaz nocifs peuvent conduire à des troubles de comportement

comme par exemple les morsures de la queue ou des oreilles (clarifications par des mesures de climat d'étable SSP).

- Vermifuger au plus tôt après une semaine.
- Donner des moyens d'occupation en suffisance: copeaux de paille ou jouets mobiles (par exemple une corbeille à foin).



Corbeille à foin

Des outils comme ici la corbeille à foin mobile, servent d'occupation et incitent à absorber des fibres. La corbeille à foin peut être achetée au SuisShop.

### 3. Alimentation des porcelets sevrés

---

- Calculer le nombre de places selon les indications optimales.
- Changement progressif de l'aliment de démarrage à l'aliment de sevrage („couper“).
- Offrir fréquemment de petites portions d'aliment afin d'éviter de surmener la digestion.
- Recommandé: de l'aliment acidifié avec une faible aptitude à lier les acides et une haute teneur en fibres.
- Lors de l'alimentation par nourrisseur à bouillie: chauffer l'aliment à température corporelle.
- Hygiène d'affouragement: nettoyer les auges chaque jour (excréments, restes d'aliment). Assurer une bonne hygiène des conduites lors d'alimentation liquide.
- Nourrisseurs à bouillie: enlever régulièrement les restes d'aliment ou excréments des mangeoires, les nettoyer rigoureusement après chaque rotation. Contrôler la qualité de l'eau.
- Lors d'un distributeur automatique d'aliments secs, veiller à ce que le stock d'aliment ne soit pas trop grand. L'aliment stocké dans l'étable sur une plus longue durée peut changer de goût.
- Approprié pour la stabilisation de la flore du tube digestif: addition d'acides ou du cola à l'aliment, de la terre à fouiller humidifiée avec du vinaigre ou du cidre, de la tourbe, de la poudre d'écorce de chêne, du marc de fruits, de la levure de bière, du vinaigre de consommation ou divers compléments d'aliment contenant des pré- et probiotiques ou des substances à base de plantes.
- Phases lumineuses prolongées pour une alimentation fréquente avec de petites rations.



Pas assez de mangeoires

Trop peu de mangeoires provoquent des luttes et ainsi des blessures, de la perte d'énergie et du stress. Le risque de maladies augmente et les animaux plus faibles prennent du retard dans leur développement.

## 4. Agents pathogènes importants lors du sevrage

Germe	Symptômes majeurs	Mesures recommandées
<b>Maladies diarrhéiques</b>		
E. coli <i>Diarrhée à E. coli et œdème à E. coli</i>	Diarrhée aqueuse, malodorante, verdâtre à brune ou maladie de l'œdème, rarement les deux en même temps	Eau, réduire le pH de l'estomac, beaucoup de fibres, aliment médicamenteux adéquat pendant environ 1 semaine (évtl. traitement à intervalle)
Lawsonia	Chétifs, croissance irrégulière, diarrhée pâteuse, couleur de ciment à sanguinolente	Hygiène, vaccination orale des porcelets sous la mère, aliment médicamenteux adéquat env. 2-3 semaines
Brachyspira	Dysenterie ou diarrhée à spirochètes: diarrhée visqueuse, évtl. sanguinolente	Traitement avec un antibiotique approprié, assainissement
Ascaride	Croissance réduite, chétifs, diarrhées occasionnelles	Vermifuger (5 -10 jours), désinfectant efficace contre les œufs de vers
Trichocéphale	Animaux pâles, chétifs, diarrhées (aussi sanguinolentes), avortements possibles	Vermifuger (10 jours), désinfectant efficace contre les œufs de vers
Coccidies	Il n'y a guère de symptômes chez les sevrés, mais les coccidies favorisent d'autres germes à diarrhées	Donner du Baycox® (Toltrazuril) pendant la première semaine de vie
Rotavirus	Il n'y a guère de symptômes chez les sevrés, mais les rotavirus favorisent d'autres germes à diarrhées	Hygiène et gestion, pas de thérapie possible
<b>Maladies générales et troubles du mouvement</b>		
Circovirus	Chétifs, croissance irrégulière, diarrhées occasionnelles	Hygiène, gestion, vaccination des porcelets sous la mère (ou immunisation maternelle)
HPS	Fièvre, toux, articulations enflées, boiteries, diarrhées, symptômes du SNC (selon souche)	Optimiser le climat, réduire le stress, aliment médicamenteux adéquat 7 à 10 jours, vaccination possible
Streptocoques	Articulations enflées, boiteries, symptômes du SNC, décès possibles (septicémie)	Hygiène, gestion, traiter les animaux individuellement, aliment médicamenteux ou vaccination spécifique à l'étable (uniquement exploitations à problèmes)
<b>Maladies des voies respiratoires</b>		
Virus à influenza	Grippe avec toux, apathie, fièvre (normalement tout le cheptel atteint)	Ev. médicaments fébrifuges, prévention d'infections supplémentaires, optimiser le climat
Bordetella	Toux, éternuement, rhume, chétifs	Climat (humidité de l'air!), médication

Ce tableau n'a pas la prétention d'être exhaustif. Il va de soi que pour toutes les maladies avec de la diarrhée et / ou de la fièvre, les mesures suivantes restent valables: offrir de l'eau en suffisance (besoin accru!) et, le cas échéant, réduire la quantité de l'aliment.

Veuillez consulter également les autres aide-mémoires et directives concernant les maladies individuelles.

---

01.11.2011 / 26.10.16

**Avez-vous des questions? N'hésitez pas à nous contacter:**

SUISAG, secteur d'activité SSP, Allmend 8, 6204 Sempach, 041 462 65 50, [info@suisag.ch](mailto:info@suisag.ch), [www.suisag.ch](http://www.suisag.ch)

**SGD Bern-  
Westschweiz**

Tél.: 031 631 23 33  
Fax: 031 302 81 09  
[sgd.bern@suisag.ch](mailto:sgd.bern@suisag.ch)

**SSP Berne Suisse  
romande**

Tél.: 024 441 61 26  
Fax: 024 441 61 27  
[ssp.orbe@suisag.ch](mailto:ssp.orbe@suisag.ch)

**SGD Sempach-  
Zentralschweiz**

Tél.: 041 462 65 70  
Fax: 041 462 65 89  
[sgd.sempach@suisag.ch](mailto:sgd.sempach@suisag.ch)

**SGD Zürich-  
Ostschweiz**

Tél.: 044 635 82 21  
Fax: 044 635 89 27  
[sgd.zuerich@suisag.ch](mailto:sgd.zuerich@suisag.ch)