


Décubitus de l'épaule / nécroses à l'épaule chez la truie

Pendant l'allaitement, la truie passe la plus grande partie de son temps en position couchée sur le côté. Pendant cette période elle est surtout couchée sur l'épaule. Contrairement à l'épaule d'autres animaux, l'épaule des porcs présente un os très proéminent (illustr. 1). L'omoplate est séparée de façon transversale par une crête osseuse compacte, proéminente au milieu.



Illustr. 1: Omoplate et épine scapulaire (flèche) : proéminence de l'épine

Avec l'âge, cette proéminence peut se transformer en exostose (tumeur bénigne causée par un traumatisme). En position couchée, la peau située sur l'exostose est comprimée, l'apport sanguin dans la peau est interrompu, entraînant une nécrose des tissus environnants. Des points de pression (décubitus) se développent. Ces endroits peuvent devenir des portes d'entrée pour les bactéries déclenchant des abcès et des nécroses purulentes. Le coussin graisseux situé sur l'omoplate protège la peau des compressions. Une insuffisance de tissus adipeux sous-cutanés favorise le risque de développer une nécrose.



Illustr. 2: **Les points de pression** sont très douloureux. L'état général de l'animal concerné peut être affecté. La tétée dure moins longtemps; la truie ne se couche pas de manière idéale (bien posée sur le côté) mais sur la crête mammaire. La production de lait diminue. Un lever / coucher plus fréquent peut conduire à plus de porcelets morts par écrasement.



Illustr. 3: **Les abcès cutanés** peuvent engendrer des modifications osseuses, voire une septicémie. Lors de l'abattage, les abcès peuvent mener à des déductions au niveau du prix de la carcasse.

Prédispositions

- Animaux avec exostose à l'épaule
- Embonpoint: des truies maigres et, plus rarement, trop lourdes sont prédisposées
- Animaux qui ont déjà contracté des nécroses
- Animaux avec boiteries: ils sont moins mobiles et se couchent de préférence sur un côté
- Animaux âgés

Mesures préventives

- Affouragement optimal des jeunes truies.
- Affouragement individuel des truies à risque également pendant la gestation
- Maintenir les truies dans un bon état d'embonpoint
- Pas d'élevage à partir de truies présentant des nécroses à l'épaule
une exostose agrandie peut être héréditaire.
- Identifier et contrôler les truies sensibles.
- Matin et soir, donner 1 dl d'huile de colza aux truies avec prédisposition à des décubitus, au début de l'allaitement selon besoin.

Traitement

- Désinfecter l'endroit avec un spray pour plaies
- Si nécessaire traitement aux antibiotiques
- Davantage de litière
- Eliminer les animaux avec de fortes nécroses à l'épaule

Autres facteurs

- Surfaces de couchage rêches et dures
- Les truies se couchent sur le côté et tentent de manger l'aliment qui se trouve dans le nid à porcelets
- Porcheries trop chaudes: les truies cherchent la fraîcheur et se vautrent dans les excréments/l'urine (→ irritation de la peau)



Illustr. 4: Elevage de jeunes truies sain