

Indice traitement des animaux (ITA) des programmes santé des porcs Plus SuisSano et Safety Plus

A partir du 2e trimestre 2018, les indications figurant dans le journal électronique des traitements JET sont utilisées pour le calcul de l'indice traitement des animaux (ITA).

Catégorie d'animaux

L'ITA est calculé pour les catégories d'animaux suivantes:

Porcelets sous la mère, porcelets sevrés, porcs d'engraissement/remontes, truies mères allaitantes et truies gestantes/verrats.

Nombres d'animaux

L'ITA est calculé pour chaque catégorie d'animaux par rapport au nombre d'animaux saisi dans les données de base.

ITA (indice traitement des animaux)

L'ITA fournit des informations sur le nombre de traitements par animal et comporte tous les traitements antibiotiques par animal. Si un ou plusieurs animaux sont traités pendant plusieurs jours, chaque jour de traitement est compté séparément.

Exemple: 5 porcelets sous la mère sont traités à la pénicilline pendant 5 jours
→ $5 * 5 = 25$ traitements.

Tous les traitements d'une catégorie d'animaux sont additionnés et divisés par le nombre d'animaux annoncé de cette catégorie.

Cas spéciaux (antibiotiques avec pondération plus élevée):

Il existe différentes préparations qui doivent être utilisées de façon particulièrement prudente. Demandez conseil à votre vétérinaire, afin d'utiliser ces préparations uniquement dans des cas absolument nécessaires.

1. **Antibiotiques critiques:** Ces antibiotiques revêtent une importance particulière pour le traitement d'êtres humains. Des exemples sont **Baytril®** ou **Marbocyl®** (fluoroquinolones). Leur utilisation dans la médecine vétérinaire devrait, autant que possible, être évitée. Dans les programmes santé des porcs Plus, les traitements avec des antibiotiques critiques sont multipliés par le facteur 4.

Exemple: 5 porcelets sous la mère sont traités avec Baytril® pendant 3 jours
→ $5 * 3 * 4 = 60$ traitements

2. **Combinaisons de préparation multiples** (exemple **CST-222**). Plusieurs antibiotiques sont combinés dans ces préparations. Cela ne correspond pas à un emploi d'antibiotiques ciblé. De ce fait, des traitements avec ces préparations sont multipliés par le facteur 5.

Exemple: 5 porcelets sevrés sont traités avec CST-222 pendant 10 jours
→ $5 * 10 * 5 = 250$ traitements

3. **Préparation à durée d'action prolongée (long-acting)**

Ces préparations agissent sur plusieurs jours par administration unique. Les traitements avec ces préparations sont multipliés par un facteur supplémentaire, correspondant à l'action prolongée (par ex. **Draxxin** facteur 7).

Exemple: 5 porcelets sous la mère sont traités une fois avec Draxxin
 $5 \times 4 \times 7 = 140$ traitements (facteur 4 pour antibiotique critique, facteur 7 pour facteur d'action)

Saisies dans le journal électronique des traitements

Les indications suivantes sont nécessaires pour le calcul correct de l'ITA:

- Nombre correct d'animaux par catégorie d'animaux (données de base)
- Nombre d'animaux traités
- Quantité des préparations
- Dosage
- Durée de traitement correcte en jours
- Indication / diagnostic

Evaluations

Chaque trimestre, les exploitations participantes aux programmes santé des porcs Plus reçoivent une évaluation de l'ITA pour chaque catégorie d'animaux détenue, comparée à toutes les autres exploitations participantes. Les derniers quatre trimestres sont présentés afin de démontrer l'évolution de l'exploitation en question.

Mesures

Si votre ITA dépasse une valeur limite d'une catégorie d'animaux, vous serez contacté par votre service sanitaire afin de fixer conjointement des mesures en la matière.

Après une année (au 2e trimestre 2019), un indice de référence (benchmark) par catégorie d'animal est calculé sur la base de toutes les exploitations, qui servira d'objectif pour l'année suivante.

ITA et pertes

Il est important de réduire l'emploi d'antibiotiques. Néanmoins, il est tout aussi important - si nécessaire - de traiter des animaux malades avec des antibiotiques. La diminution de la consommation d'antibiotiques ne doit pas se réaliser au détriment de la santé animale.

C'est pourquoi, outre les traitements, également les pertes d'animaux par catégorie d'animaux doivent être correctement saisies: les pertes des porcelets sous la mère dans le planificateur de truies/journal repro et les pertes des porcelets sevrés, remontes, truies mères, verrats ou porcs d'engraissement dans le JET. Dans les évaluations, les ITA sont aussi présentés par rapport aux pertes.

Questions?

Votre conseiller du SSP ou de Qualiporc ainsi que la hotline de SUISAG se tient à votre entière disposition pour vous fournir de plus amples renseignements sur l'ITA.